

## Hogyan kezeljük mi az időskori sántaságot?

Written by ProVet


Wednesday, 20 February 2019 14:16 - Last Updated Wednesday, 20 February 2019 17:00

---

There are no translations available.

### Kombinált kezelés az arthroszterápiában

Az osteoarthritis vagy a magyar nomenklatúrában arthrosis az ízületeket érintő degeneratív elváltozások összefoglaló neve. Jellemzőségei az ízületi porc felszínének egyenetlenné válása, elvékonyodása, esetenként teljes elkopása. Ezen kívül az ízületi tok megvastagodása, csontfelrakódások kialakulása az ízületi tok tapadási területein vagy máshol is, esetenként kis szilárd képletek leválása és szabad úszkálása az ízület üregében. Ezeket ízületi egereknek hívjuk. Az ízület folyadék, a synovia is jelentős változásokon megy keresztül. A sűrű szalmasárga viszkózus normál folyadék helyett vízszerű, sokszor véres folyadékot találunk. A vér a porc lekopása következtében megnyílt porc alatti vérerekből származik. Ez a megváltozott synovia már nem tudja ellátni eredeti funkcióját a porcsejtek táplálását és az ízület kenését, így tovább súlyosbodik az elváltozás. Az ilyen módon megbetegedett ízület mozgáspályája egyre jobban beszűkül a fájdalom miatti csökkent használat, valamint a megvastagodott ízületi tok és a csontfelrakódások miatt.



### Mit tehetünk?

Ma már rendelőnkben minden olyan gyógykezelési forma rendelkezésre áll, amit embereknél halkalmaznak

## Hogyan kezeljük mi az időskori sántaságot?

Written by ProVet

Wednesday, 20 February 2019 14:16 - Last Updated Wednesday, 20 February 2019 17:00


---

A hagyományos, nem szteroid gyulladáscsökkentő tablettákkal történő kezelés a korszerű terápiának ma már csak az egyik eleme. Ezen kívül lehetőségünk van az ízületbe közvetlenül juttatni gyógyszereket. Ez a beavatkozás bizonyos ízületek esetében bódításban történik. Az ízületbe adhatunk hosszú hatású gyulladáscsökkentő készítményt, gyakrabban hyaluronsav injekciót, vagy PRP-t.

A hyaluronsav az ízületi porc alapállományának fontos alkotója, ezenkívül gyulladáscsökkentő hatású, és elősegíti a synovia normál konzisztenciájúvá alakulását. Többféle koncentrációban és molekulatömegben áll rendelkezésünkre, az adott esethez határozzuk meg, hogy melyiket javasoljuk.



A PRP (Platelet Rich Plasma) magyarul trombocita gazdag plazma az állat saját véréből készül. Egy speciális szeparátor szettben történő centrifugálás során koncentrálnak a trombocitákat (ezek a vérlemezkék, amelyek a vér normál alkotórészei) és ezt a koncentrátumot adjuk be az ízületbe. A trombociták rendkívül sok növekedési faktort tartalmaznak, melyek segítik a sérült porc regenerációját.



Ugyancsak fontos része a kezelésnek a porc regeneráló táplálékkiegészítők adása. Ezek olyan anyagokat tartalmaznak, melyekből az ízületi porc alapállomány, a porcsejtek közötti mátrix felépül. A mátrix alkotja az ízületi porc mennyiségének 90 százalékát. Ezek között a táplálékkiegészítők között nagyon sok a megbízhatatlan, a hatóanyagokat nem, vagy csak a deklarálnál sokkal kisebb mennyiségben tartalmazó készítmény. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket használjuk. Rendelőnkben kizárólag ellenőrzött, és a legmodernebb összetételű, kiválóan hasznosuló táplálékkiegészítőket forgalmazunk.



Hasonlóan fontos része a kezelésnek a fizioterápia. Ehhez érdemes fizioterapeuta segítségét igénybe venni. A manuális kezelésen (masszázs, a beteg ízület passzív mozgatása, tornáztatása) kívül ultrahang, vagy rádiófrekvenciás kezelés is igénybe vehető. A testsúlycsökkentés jelentősen tud javítani kedvencünk állapotán, és csökkenti a felhasználandó gyógyszerek dózisékat. A leírt kezelések mind hozzájárulnak a beszűkült mozgáspálya

## Hogyan kezeljük mi az időskori sántaságot?

Written by ProVet

Wednesday, 20 February 2019 14:16 - Last Updated Wednesday, 20 February 2019 17:00

---

rehabilitációjához.

**Figyelem!** Az arthrosis nemcsak idős kutyák betegsége lehet! A fiatal korban nem diagnosztizált könyök- vagy csípőízületi diszplázia, az ízület sérülése, mind vezethet arthrosis kialakulásához. Az arthrosis terápia célja az ízületben elindult degeneratív folyamatok megállítása, lelassítása. E megindult degeneratív elváltozást visszafordítani nagyon ritkán lehetséges.

Ezért lenne fontos a korai szűrővizsgálatok igénybe vétele, különösen azoknál a fajtáknál, ahol gyakori a csípő és könyökízületi diszplázia. Az időben kiderülő elváltozások kezelhetők, így az arthrosis kialakulása megelőzhető. Csípőízületi diszplázia korai szűrésére 16-18 hetes életkor, könyökízületi diszplázia szűrésére a 20-25 hetes életkor a legalkalmasabb egyébként tünetmentes kölyökkutyák esetében. Ha sántaság jelentkezik ennél fiatalabb korban, akkor ortopédiai szakvizsgálat és ennek függvényében esetleg röntgenvizsgálat indokolt.